




Informatie van uw tandarts

Extractie





Extraheren

Het trekken van tanden en kiezen



Soms is het nodig om een tand of kies te laten verwijderen. Redenen hiervoor kunnen zijn: tandbederf, tandvleesontsteking, ruimtegebrek of omdat er geen andere behandeling meer mogelijk is. Door de verdoving is de ingreep vrijwel altijd pijnloos.

Hoe bereidt u zich voor op de behandeling?

Op de dag van de behandeling mag u gewoon eten. Gebruikt u medicijnen? Dan is het verstandig de tandarts hiervan op de hoogte te brengen. De meeste medicijnen kunnen gewoon op de dag van de behandeling worden ingenomen. Bij gebruik van antistollingsmiddelen wordt er gekeken of dit tijdelijk aangepast moet worden. Informeer uw tandarts hierover tijdig.

De ruimte opvullen na het trekken van tanden en kiezen (indien nodig) wordt gedaan middels een prothese, plaatje, frameprothese, brug of implantaat.

Na de behandeling

Na het trekken van de tand of kies laten we u, meestal, op een gaasje bijten om het bloeden te laten stoppen. Als het bloeden niet stopt, kunt u opnieuw op het gaasje bijten. Bloedt het na een paar uur nog steeds of is uw lichaams-temperatuur meer dan 39°C, neem dan contact op met de praktijk.

Bij het trekken van een verstandskies uit de onderkaak, kunt u een dikke wang krijgen. Om de zwelling te verminderen, raden wij u aan uw gezicht direct na de behandeling te koelen met bijvoorbeeld ijsblokjes in een washandje.

De zwelling kan tot drie dagen na het trekken toenemen, al dan niet met een verkleuring. Blijft de zwelling toenemen of krijgt u slikklachten, neem dan contact op met de praktijk.

Verdoving en nazorg

Als de verdoving na één tot vier uur raakt uitgewerkt, kan er pijn ontstaan. Deze pijn is meestal goed te onderdrukken met een pijnstillertje, bijvoorbeeld paracetamol. U kunt beter geen aspirine nemen, omdat dit bloedstolling tegengaat. Wanneer u bepaalde medicijnen gebruikt, kan het zijn dat de tandarts u een ander geneesmiddel voorschrijft.

Voorkom problemen met deze tips

Niet doen op de dag van de behandeling:

- spoelen
- alcohol gebruiken
- roken



Praktische informatie

- **Genezing**

Het duurt ongeveer tien dagen voordat de wond helemaal dicht is. De wond geneest het snelst, wanneer het bloed in de wond goed kan stollen. Spoel daarom uw mond niet te krachtig op de dag van de behandeling. Zo voorkomt u dat het stolsel wegspoelt.

- **Eten en drinken**

Na één of twee uur kunt u weer voorzichtig gaan eten en drinken. Wees voorzichtig als de verdoving nog niet helemaal is uitgewerkt. U kunt namelijk gemakkelijk op de lip, tong of wang bijten.

- **Tandenpoetsen**

Als de verdoving is uitgewerkt, kunt u uw gebit weer gewoon poetsen. Wees alleen wel voorzichtig rond de plaats waar de tand of kies getrokken is.

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Vraag het uw tandarts.

